

BENEFICIOS

- Previene y corrige desordenes nutricionales.
- Mejora la consistencia de la fruta.
- Aumenta la firmeza y la vida post-cosecha

ANÁLISIS GARANTIZADO

Contenido	% p/v
Nitrógeno (N)	13,0
Calcio (CaO)	13,0
Potasio (K2O)	6,5
Magnesio (MgO)	2,5

Densidad	1,3
pH	6,0
Solubilidad	99,9%

Aplicación

Cultivo	Etapas de Aplicación	Dosis Recomendada	Frecuencia
Frutales (manzano, peral, cítricos)	Cuajado – Maduración	2 – 3 L/ha (foliar) / 4 L/ha (fertilirriego)	Cada 10–15 días
Frutales de carozo	Desarrollo de fruto	2 – 3 L/ha (foliar) / 3 – 4 L/ha (fertilirriego)	Cada 10–15 días
Uva de Mesa / Vinífera	Envero – Cosecha	2 – 3 L/ha (foliar) / 3 – 4 L/ha (fertilirriego)	Cada 10 días
Berries	Fructificación – Cosecha	2 L/ha (foliar) / 3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10 días
Hortalizas (lechuga, espinaca, tomate)	Formación de órganos	1,5 – 2,5 L/ha (foliar) / 3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10 días
Papa, Maíz, Remolacha	Desarrollo vegetativo – Llenado	2-3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10–15 días

Cadmio (Cd) ≤ 10,0 mg/ Kg; Cromo(Cr) ≤ 10,0 mg/Kg;Plomo(Pb) ≤ 10,0 mg/Kg; Mercurio(Hg) ≤ 10,0mg/Kg Arsénico(As) ≤ 10,0 mg/Kg.

Lote:_____

Elaboración:_____

Vencimiento:_____



Fabricado por Química Artepasta Limitada

Distribuido por Agro Stoltz

Notas al comprador: A nuestro entender, la información de esta etiqueta es veraz y precisa. Sin embargo, el fabricante no garantiza los resultados de uso, ya que su aplicación depende de condiciones fuera de nuestro control. El comprador asume todos los riesgos asociados al uso y manejo, siguiendo o no las instrucciones. La garantía se limita únicamente a la calidad del producto y al contenido del ingrediente activo al momento de su despacho.

Fitotoxicidad: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

Almacenamiento: Almacenar en su envase original, bien cerrado, en un lugar seco, fresco, ventilado y protegido de la luz solar directa. Evitar temperaturas extremas (bajo 5 °C o sobre 35 °C). No reutilizar el envase vacío.

Compatibilidad: Compatible con la mayoría de fertilizantes y bioestimulantes. Realizar prueba de compatibilidad antes de mezclar.

Agitar antes de usar