

BENEFICIOS

- Incrementa la producción y aumenta la vida útil en post-cosecha.
- Promueve la producción de defensas y hormonas naturales.
- Aumenta el tamaño, la cuaja y la firmeza de los frutos.
- Aporta Potasio altamente disponible y de fácil absorción.
- Versátil y seguro de usar en todo tipo de cultivos, incluso nativos.
- Alto contenido energético de rápida asimilación.

Aplicación

Cultivo	Etapas de Aplicación	Dosis Recomendada	Frecuencia
Frutales (Manzano, Palto, Peral, Citricos)	Cuajado – Engorde de fruto	2 – 3 L/ha (foliar) / 3 – 4 L/ha (fertilirriego)	Cada 10-15 días
Frutales de carozo (Duraznero, Ciruelo, Nogal, Cerezo)	Prefloración – Fructificación	2 L/ha (foliar) / 3 – 4 L/ha (fertilirriego)	Cada 10-15 días
Uva de Mesa / Vinífera	Post-cuajado – Envero	2 – 3 L/ha (foliar) / 3 – 4 L/ha (fertilirriego)	Cada 10 días
Berries	Desarrollo vegetativo – maduración	1,5 – 2 L/ha (foliar) / 3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10 días
Hortalizas (lechuga, espinaca, tomate)	Desarrollo vegetativo – fructificación	1,5 – 2 L/ha (foliar) / 3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10 días
Papa, Maíz, Remolacha	Desarrollo vegetativo – tuberización	2-3 L/ha (fertilirriego)	Cada 10-15 días

ANÁLISIS GARANTIZADO

Contenido	% p/v
Nitrógeno (N)	1,6
Fósforo (P2O5)	1,6
Potasio (K2O)	9,0

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS

Densidad	1.20 g/L a 20°C
pH	9,5
Solubilidad en agua	99,9% a 20°C

METALES PESADOS

Cadmio (Cd) ≤ 10,0 mg/ Kg; Cromo(Cr) ≤ 10,0 mg/Kg;Plomo(Pb) ≤ 10,0 mg/Kg; Mercurio(Hg) ≤ 10,0mg/Kg Arsénico(As) ≤ 10,0 mg/Kg.

Lote:_____

Elaboración:_____

Vencimiento:_____