

BENEFICIOS

- Aumenta el calibre y el peso del fruto al favorecer el llenado celular y la acumulación de azúcares.
- Mejora la coloración y uniformidad del fruto mediante la estimulación de pigmentos naturales.
- Optimiza el transporte de potasio y carbohidratos hacia los órganos de cosecha.
- Potencia la fotosíntesis incrementando la producción de clorofila en etapas de alta demanda.
- Eleva la eficiencia metabólica al activar enzimas clave en la asimilación de nutrientes.
- Mejora la absorción y movilidad de nutrientes gracias a los ácidos fúlvicos y la materia orgánica.

Aplicación

Cultivo	Etapas de Aplicación	Dosis Recomendada	Frecuencia
Frutales (manzano, cítricos, peral)	Cuaja, llenado de fruto, viraje de color	3,5 – 6,0	2 a 3 aplicaciones cada 10-15 días
Frutales de carozo (duraznero, ciruelo)	Post cuaja, endurecimiento de carozo	3,5 – 6,0	2 a 3 aplicaciones cada 10-15 días
Uva de mesa / vinífera	Envero, maduración y pre-cosecha	3,5 – 6,0	2 a 3 aplicaciones cada 10 días
Berries (arándano, frambuesa, etc.)	Desarrollo del fruto y viraje	2,5 – 4,0	2 a 3 aplicaciones cada 7-10 días
Hortalizas (tomate, lechuga, albahaca)	Formación y engrosamiento del fruto/hoja	1,5 – 2,5	2 a 3 aplicaciones cada 10 días
Papa, maíz, remolacha	Inicio de tuberización / engrosamiento	1,5 – 2,0	2 a 3 aplicaciones cada 10-12 días

ANÁLISIS GARANTIZADO

Contenido	% p/v
Potasio (K2O)	23,0
Aminoácidos libres	5,0
Boro (B)	3,0
Magnesio (MgO)	0,8
Molibdeno (Mo)	0,4
Ácidos fúlvicos	4,0
Materia orgánica	5,0

Densidad	1,30 – 1,40 g/mL
pH	6,0 – 7,0
Solubilidad	99%

Cadmio (Cd) ≤ 10.0 mg/kg; Cromo (Cr) ≤ 10.0 mg/kg; Plomo (Pb) ≤ 10.0 mg/kg; Mercurio (Hg) ≤ 10.0 mg/kg; Arsénico (As) ≤ 10.0 mg/kg

Lote:_____

Elaboración:_____

Vencimiento:_____



Fabricado por Química Artepasta Limitada

Distribuido por Agro Stoltz

Notas al comprador: A nuestro entender, la información de esta etiqueta es veraz y precisa. Sin embargo, el fabricante no garantiza los resultados de uso, ya que su aplicación depende de condiciones fuera de nuestro control. El comprador asume todos los riesgos asociados al uso y manejo, siguiendo o no las instrucciones. La garantía se limita únicamente a la calidad del producto y al contenido del ingrediente activo al momento de su despacho.

Fitotoxicidad: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

Almacenamiento: Almacenar en su envase original, bien cerrado, en un lugar seco, fresco, ventilado y protegido de la luz solar directa. Evitar temperaturas extremas (bajo 5 °C o sobre 35 °C). No reutilizar el envase vacío.

Compatibilidad: Compatible con la mayoría de fertilizantes y bioestimulantes. Realizar prueba de compatibilidad antes de mezclar.

Agitar antes de usar